


SECOURIR





PROTEGER soi-même, les autres :

Débrancher, Mettre en hauteur l'objet déclencheur

EN CAS DE CONTACT AVEC LE SANG DE LA VICTIME, RAPPELEZ LE 15 POUR UNE PRISE EN CHARGE DE SOI-MEME ET DES ANALYSES!



 1. SAIGNE ABONDEMENT ?	<u>Saignement visible ?</u> - Cherchez son origine PALPER SOUS LES MEMBRES regarder ses mains après chaque parties	COUCHER LA PERSONNE au sol -Faire compresser sa plaie par la victime OU -le faire soi même afin d'arrêter le saignement NE PAS utiliser un linge comme pansement cela absorberait le sang ! Couvrir et rassurer la victime 	 NEZ : position assise, tête droite comprimer les narines <u>10 minutes entières</u> Si cela ne s'arrête pas = Samu 15 Vomi , crache , toussse , fait caca du sang = Samu 15
2. ETOUFFEMENT ?  -Mains à la gorge - S'agite ne pas faire boire ni manger 	AUNCUNS SONS (obstructions totale)  <u>NE PAS DEPLACER TETE EN BAS RETENIR LA VICTIME</u>  - 1 à 5 tapes dans le dos au niveau du soutien gorge sur la colonne vertébrale (avec paume de main) puis - 1 à 5 compressions thoraciques <u>recommencer jusqu'à ce qu'il crache le morceau ou s'évanouisse</u>  S' ARRETER AU MOINDRE BRUIT 	LEGER SONS (obst. partielle)  <u>NE PAS TAPER !</u> Afin de ne pas risquer de bloquer complètement le morceau ENCOURAGER A TOUSSER tête en bas rassurer	<u>Morceau non expulsé :</u>  <u>Perd connaissance :</u> = massage cardiaque (voir en bas)

2. ETOUFFEMENT BEBE  - s'agite / panique - pas de sons - bouche qui hurle sans volume	- s'asseoir calé - Poser BB sur son avant bras - bras calé sur genoux - visage BB en bas  BIEN TENIR LA TETE 	AUCUNS SONS (<i>obstruction totale</i>)  -1 à 5 tapes entre les 2 omoplates → PUIS →  -1 à 5 tapes compressions thoraciques(sur le sternum avec 2 doigts)  S' ARRETER AU MOINDRE BRUITS !	LEGER SONS (obst. Partielle)  <u>NE PAS TAPER !</u> Afin de ne pas risquer de bloquer complètement le morceau BB sur avant bras tête en bas 
3. REPOND PAS ? (inconscience) 	- Faire parler - compresser les épaules - demander de serrer la main /de cligner les yeux  - taper fort des mains à coté de ses oreilles - chatouiller parties sensibles	<u>Respire -t-il ??</u> → OUI = <u>Placer SUR LE DOS Vérifiez pendant 10 vrai secondes :</u> -approcher notre oreille de sa bouche basculer sa tête en arrière -regarder thorax qui se soulève -ne pas faire boire ni manger POSITION PLS (sur le côté) 1 main sous son visage visage vers le bas <u>OUVRIR SA BOUCHE</u> couvrir <u>bien caler !</u> 	APPELER 15  Surveiller la respiration en cas d'arrêt cardiaque
4. RESPIRE PAS ?  On voit le ventre se soulever	Vérifier respiration victime couché sur <u>LE DOS !</u> -pas de souffle -pas de bruit - ni ventre ni poitrine se soulève	RESPIRE PAS ou le moindre doute (gasp) = ARRET CARDIAQUE 	Faire une RCP, (réanimation) <u>30 compressions , 2 insufflations</u>   Insufflation : Relever sa tête BOUCHER son NEZ 